

よりそい、つよく、ささえる。

IKARI

手の届かない高所や隙間、粉だまりに潜む

貯穀害虫やユスリカ・コバエ対策に

業務用

防虫くん煙剤

コラバス・スモーク

製造工場

倉庫

定期的なくん煙に
発生源対策や予防に



ユスリカ・コバエ等
成虫を退治したい



成虫だけでなく、
幼虫も退治したい

火を使わない！水始動タイプ
コラバス・スモークEX-W

包材関係・穀物倉庫等、
火気厳禁の施設にオススメ！



発生源・幼虫対策+成虫対策 **EX** **W** と、成虫対策 **FT** の2タイプを用意。 火気厳禁の施設では、水始動タイプ **W** がオススメ。

1

**速効性がある有効成分で
成虫対策**

FT
EX
W

成虫対策の有効成分は、速効性のあるピレスロイド系を使用しています。また急性毒性が低いので安全性に配慮しています。

2

**「昆虫成長制御剤」の配合は
くん煙剤としては業界初!**

EX
W

残効性が高く、低薬量で喫食・接触の両方で作用。幼虫の脱皮、蛹化、羽化の各ステージで阻害効果を発揮します。



3

**薬剤の煙が全域に充満し、
発生源に届く!**

FT
EX
W

くん煙の加熱による上昇気流によって、高さ約8~10m*¹の天井にも煙が届き拡散します。また、大容量の600gは広い空間の施工に適しています。

また清掃が行き届きにくい高所や狭所(照明の傘、人が入りにくい隙間等)にも煙が届くので発生源対策*²に効果的です。

※1: 気流がほとんどない条件 ※2: EX、EX-W

4

蒸散しやすい有効成分

FT

成虫対策の有効成分は、蒸散性が高く時間経過とともに気体となって拡散します*⁴。

※4: 付着した素材によっては残留する場合があります

		薬剤付着量(標準量噴霧)	
		4時間後	6時間後
拭き取り	ステンレス板(床面)	<0.01	<0.01
	ウレタンベルト(床面)	<0.01~0.01	<0.01

<0.01 : 0.01mg/m²未満
社内試験データ: 試験結果を保証するものではありません

5

**水始動タイプも用意。
火気厳禁の施設でも
使える!**

W

火気厳禁の施設(包材関係、穀物倉庫等)でも使用できる水始動タイプを用意しました。火を使わないので安心して使用できます。

W
水始動タイプ

EX
着火タイプ

FT
着火タイプ

200g
コラバス・スモークEX-W

200g 600g
コラバス・スモークEX

200g 600g
コラバス・スモークFT

コラバス・スモーク 製品仕様

品名	コラバス・スモークFT	品名	コラバス・スモークEX	品名	コラバス・スモークEX-W
剤型	くん煙剤(着火式)	剤型	くん煙剤(着火式)	剤型	くん煙剤(水始動)
有効成分	ピレスロイド系殺虫剤	有効成分	昆虫成長制御剤、ピレスロイド系殺虫剤	有効成分	昆虫成長制御剤、ピレスロイド系殺虫剤
対象害虫	飛翔性不快害虫の成虫(ユスリカ・コバエ類・メイガ・シバンムシ等)	対象害虫	ユスリカ・コバエ類などの飛翔性不快害虫、貯穀害虫・チャタテムシ	対象害虫	ユスリカ・コバエ類などの飛翔性不快害虫、貯穀害虫・チャタテムシ
容量	200g・600g	容量	200g・600g	容量	200g
有効範囲(容積)	[200g] 400~800m ³ [600g] 1200~2400m ³	有効範囲(容積)	[200g] 飛翔性昆虫・チャタテムシ: 150~300m ² (375~750m ³) 貯穀害虫: 90~130m ² [600g] 飛翔性昆虫・チャタテムシ: 450~900m ² (1125~2250m ³) 貯穀害虫: 270~390m ²	有効範囲(容積)	飛翔性昆虫・チャタテムシ: 150~300m ² (375~750m ³) 貯穀害虫: 90~130m ²

●くん煙開始後、FTは約4時間、EX及びEX-Wは6~8時間程度締め切ってください。経過後は、十分換気をしてから入室してください。 ●人によっては弱い皮膚刺激を感じることがあります。

IKARI **イカリ消毒株式会社**

本社 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 TEL.03-3356-6191 FAX.03-3350-1405
大阪オフィス 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 TEL.06-6636-2741 FAX.06-6636-2720
<https://www.ikari.co.jp/>

このパンフレットに記載されている内容は2025年9月現在のものです

お問い合わせ先